

แนวทางการสั่งใช้ยาความเสี่ยงสูง (HAD)

ผู้รับผิดชอบ	แนวทาง	Instrument/Intervention
พยาบาล	<pre> graph TD Start([Check history before meeting doctor]) --> Decision1{เริ่ม HAD ครั้งแรก/ เริ่มใหม่หลังหยุดยา > 3 mo} Decision1 -- ใช่ --> Step1[ส่งตรวจ Lab HAD ก่อนเริ่มยา] Decision1 -- ไม่ใช่ --> Step2[คัดกรองอาการ S/E จากการใช้ยาเบื้องต้น] Step1 --> Decision2{ผล Lab ปกติ} Decision2 -- ไม่ใช่ --> Step3([พิจารณา ยาอื่น]) Decision2 -- ใช่ --> Step4[- สั่งใช้ยา HAD - ส่งตรวจ Lab ครั้งถัดไป] Step4 --> Step5([จ่ายยาและให้การบริบาล เภสัชกรรมแบบ New case]) Step2 --> Decision3{ไม่มี S/E ± Lab ปกติ} Decision3 -- ไม่ใช่ --> Step6[- ประเมินความรุนแรงและความ สอดคล้องด้านยา - ระบุแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้านยา] Decision3 -- ใช่ --> Step7([จ่ายยาและ ให้คำแนะนำ]) Step6 --> Step8[พบแพทย์ติดตามผลการรักษาและ อาการไม่พึงประสงค์] Step8 --> Decision4{ใช้ยา HAD เดิม} Decision4 -- ไม่ใช่ --> Step3 Decision4 -- ใช่ --> Step7 </pre>	- ขั้นตอนปฏิบัติในการซักประวัติผู้ป่วยก่อนพบแพทย์
พยาบาล		
แพทย์		- ระเบียบปฏิบัติยาความเสี่ยงสูง
แพทย์		- ขั้นตอนการดูแลรักษาของแพทย์ - ระเบียบปฏิบัติยาความเสี่ยงสูง - แบบประเมินการใช้ยาความเสี่ยงสูง
เภสัชกร		- ระเบียบปฏิบัติยาความเสี่ยงสูง - เอกสารแนะนำการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
พยาบาล		- ขั้นตอนปฏิบัติการค้นปัญหาจากการใช้ยาเบื้องต้น - เอกสารผล Lab ของผู้ป่วย
พยาบาล		
เภสัชกร		- เครื่องมือ Naranjo algorithm - เกณฑ์การประเมิน ADR ที่ร้ายแรง - เกณฑ์การประเมิน ADR ที่ป้องกันได้ - ขั้นตอนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
แพทย์		- ขั้นตอนการดูแลรักษาของแพทย์
แพทย์		

